

Лихорадка Эбола

Лихорадка Эбола – острое заболевание, вызываемое вирусом Эбола, протекающее с выраженным геморрагическим синдромом, часто приводящее к смерти людей. Заболевание относится к особо опасным вирусным инфекциям.

Восприимчивость людей к лихорадке Эбола высокая. Заболевание передается при прямом контакте с кровью или выделениями зараженного человека или при контакте с предметами, на которые попали инфицированные выделения. Внедрение вируса в организм происходит при попадании вируса на слизистые оболочки и поврежденную кожу. Вирус Эбола мигрирует от места внедрения к регионарным лимфатическим узлам, к печени, селезенке и надпочечникам. Воздушно – капельная передача маловероятна.

Инкубационный период длится от нескольких дней до 2-3 недель. Начало заболевания острое, с повышением температуры тела до 38-39⁰. Могут проявиться явления ангины. На 5-7 день может появиться сыпь (обычно на лице, шее, туловище, руках). Присоединяется неукротимая рвота, боли в животе, диарея. Развивается геморрагический синдром с кровотечениями, кровавой рвотой. Могут наблюдаться признаки энцефалопатий (возбуждение, агрессивность). Симптомы лихорадки Эбола можно спутать с другими распространенными инфекционными заболеваниями.

В нашу страну лихорадка Эбола может быть завезена из стран Центральной и западной Африки. Поэтому лицам, прибывшим из пораженных вирусом Эбола стран, рекомендуется самостоятельное наблюдение за состоянием своего здоровья в течение 21 дня после отъезда из этой страны. При появлении температуры или каких либо симптомов заболевания, необходимо обращаться за медицинской помощью.